

SVT CON TRE SOCCORRITORI

EVENTO	TEAM LEADER	1° SOCCORRITORE	2° SOCCORRITORE
Arrivo del team sul target	Valutazione sicurezza della scena (in caso di scena non sicura comunica al 2° soccorritore di allertare il 118)	Valutazione sicurezza della scena	Valutazione sicurezza della scena (telefona al 118 dietro indicazione del TL in caso di scena non sicura)
Triage (se presente piu' di un paziente)	Esegue il triage secondo il metodo CESIRA, valuta la Dinamica dell'evento e comunica le priorità di trattamento ai soccorritori	E' di supporto al TL ed esegue le sue direttive	E' di supporto al TL ed esegue le sue direttive
Valutazione rapida (pochi secondi, durante l'avvicinamento)	Esegue la Valutazione rapida (sesso, età, apparente stato di coscienza, posizione, presenza di respiro)	E' di supporto al TL ed esegue le sue direttive	E' di supporto al TL ed esegue le sue direttive
Valutazione primaria (paziente cosciente) -Fase A	Esegue la valutazione della pervietà delle vie aeree del paziente in posizione supina, pronto a risolvere una eventuale ostruzione	Esegue, dietro indicazione del TL, l'immobilizzazione manuale del rachide cervicale in posizione neutra (che verrà mantenuta anche in presenza di collare, fino all'immobilizzazione completa su tavola spinale)	Dopo la valutazione della Fase A da parte del TL, dietro sua indicazione, applica il collare cervicale
-Fase B	Garantisce e mantiene una ventilazione efficace pronto a supportare la respirazione se necessario	Continua l'immobilizzazione manuale del rachide cervicale	E' a disposizione del TL, del quale esegue i comandi (ad es: gli fornisce il materiale per la ventilazione; pallone collegato a bombola di O2)
-Fase C	Valuta i segni di circolo e la presenza di emorragie	" "	E' a disposizione del TL, del quale esegue i comandi (ad es: tampona emorragie importanti)
-Fase D	Valuta lo stato neurologico secondo lo schema A,V,P,U	" "	E' a disposizione del TL, del quale esegue i comandi
-Fase E	Esegue una valutazione Testa-Piedi del paziente assicurando anche la protezione termica	" "	E' a disposizione del TL, del quale esegue i comandi
Durante tutte le fasi di valutazione il TL, con il supporto anche del 1° e 2° soccorritore, deve attentamente sorvegliare lo stato di coscienza del paziente, in modo da poter passare immediatamente, se necessario, all'algoritmo BLS			
BLS NEL PAZIENTE VITTIMA DI TRAUMA			
	TEAM LEADER	1° SOCCORRITORE	2° SOCCORRITORE
-Fase A: • Stato di coscienza • Pervietà vie aeree	Valuta lo stato di coscienza (se il paz. non è cosciente dice al 2° soccorritore di chiamare il 118 . DAE e O2 devono essere già presenti). Valuta la pervietà delle vie aeree	Immobilizza manualmente il rachide	Dietro indicazione del TL telefona al 118
-Fasi B e C: • GAS (valutazione respiro e segni di circolo)	Esegue le valutazioni B e C e riferisce l'esito delle valutazioni al 2° soccorritore	" "	Mentre il TL esegue le valutazioni B e C applica il collare cervicale e poi comunica alla CO118 l'esito delle valutazioni eseguite dal TL
RCP	Se i parametri vitali sono assenti inizia RCP. Si alterna al massaggio con il 2° soccorritore ogni 2 minuti	Immobilizza manualmente il rachide ed esegue le ventilazioni aiutandosi a mantenere l'immobilità del rachide cervicale con le ginocchia/cosce	Si pone dalla parte opposta al TL con il DAE e lo usa. (e' lui l'operatore DAE). Si alterna al massaggio con il TL ogni 2 minuti